



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



QUÍMICA

Tema: **FUNCIONES OXIGENADAS**
Semana: 23

I. OBJETIVOS

Los estudiantes, al término de la sesión de clases serán capaces de:

1. **Identificar y clasificar** los compuestos oxigenados según su grupo funcional.
2. **Formular y nombrar** a los compuestos oxigenados aplicando la nomenclatura común y la sistemática.
3. **Identificar** las principales propiedades y aplicaciones de los compuestos oxigenados más resaltantes.

II. INTRODUCCIÓN

En las siguientes muestras de consumo cotidiano encontramos compuestos oxigenados:



El **anisado** es un buen digestivo



El **zum de limón** es un antioxidante orgánico:



La **piña** tiene un olor característico y agradable.

- El anisado es digestivo debido al **anisol** disuelto en **etanol**.
- El zumo de limón es un antioxidante orgánico debido al **ácido cítrico**.
- El olor agradable de la piña se debe al **butanoato de etilo**

Los nombres resaltados son compuestos orgánicos oxigenados, que serán estudiados, según los objetivos indicados.

III. FUNCIONES OXIGENADAS

Son compuestos orgánicos ternarios constituidos por átomos de carbono, hidrogeno y oxígeno “**C,H,O**” donde el átomo de oxígeno forma parte del grupo funcional.



Alcohol isopropílico
($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$)



Acetona
(CH_3COCH_3)



éter dietílico
($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$)

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES OXIGENADAS




FUNCIÓN OXIGENADA	GRUPO FUNCIONAL	NOMBRE GRUPO FUNCIONAL	FÓRMULA GENERAL
Alcohol	- OH	Hidroxilo	$\text{R} - \text{OH}$
Éter	- O -	Oxi	$\text{R}_1 - \text{O} - \text{R}_2$
Aldehído	- CHO	Carbonilo	$\text{R} - \text{CHO}$
Cetona	- CO -	Carbonilo	$\text{R}_1 - \text{CO} - \text{R}_2$
Ácido Carboxílico	- COOH	Carboxilo	$\text{R} - \text{COOH}$
Éster	- COO -	Carboalcoxi	$\text{R}_1 - \text{COO} - \text{R}_2$

R , R_1 y R_2 son grupos sustituyentes


IV. ALCOHOLES

Son compuestos oxigenados que en su estructura tienen como grupo funcional al hidroxilo “—OH” unido al átomo de carbono con enlaces simples u orbitales híbridos sp^3 .

Ejemplo: Los siguientes productos contienen alcohol




▪ En su estructura se tiene:




Ejemplos:

Indique aquella sustancia que es considerada un alcohol.




No es alcohol



Si es alcohol

▪ Fórmula general:



R: grupo alquilo

Las moléculas de los alcoholes:

- son polares por el OH.
- se unen por EPH y FL.
- Si aumenta el # de C, disminuye su polaridad.

4.3. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común

Alcohol nombre del sustituyente (R-) **ico**

Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{—OH}$: alcohol metílico
(alcohol de madera)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$: alcohol etílico
(espíritu del vino)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$: alcohol propílico
(alcohol de carpintero)

$\text{CH}_3\text{—}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{—CH}_3$: alcohol isopropílico
(forma parte del ron de quemar)


B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

En el nombre del hidrocarburo, se cambia la terminación “o” por “ol”.


Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{—OH}$: metanol $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$: etanol

Si el # de C ≥ 3 ,
la cadena principal se enumera por el extremo **más próximo** al hidroxilo —OH .



IUPAC 1979: 1-propanol
IUPAC 1993: propan-1-ol




IUPAC 1979: 2-propanol
IUPAC 1993: propan-2-ol

Los alcoholes, a partir del propanol presentan isómeros de posición, según la ubicación del —OH .

Nomenclatura sistemática o IUPAC de alcoholes de cadena ramificada y /o insaturado

Para la numeración de la cadena principal, el -OH tiene mayor jerarquía para llevar la menor numeración, respecto al grupo alquilo e insaturación (doble o triple enlace).


Ejemplo 1:



IUPAC 1979: 4- isopropil-6,6-dimetil-4-octanol

IUPAC 1993: 4-isopropil-6,6-dimetiloctan-4-ol

Ejemplo 2:



IUPAC 1979: 4-etil-4-metil-5-hexen-2-ol

IUPAC 1993: 4-etil-4-metilhex-5-en-2-ol





4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALCOHOLES:

A. SEGÚN EL NÚMERO DE GRUPOS HIDROXILO (-OH)

■ Monol

Poseen sólo **un hidroxilo** (-OH) en su estructura


Ejemplos:




■ Poliol

Poseen **dos o más hidroxilos** (-OH) en su estructura, unidos a carbonos diferentes.


Ejemplos:



1,2-etanodiol (etanodiol)
(etilenglicol)



1,2,3 -propanotriol (propanotriol)
(glicerina)




IUPAC 1979: 1,2,4-pentanotriol

IUPAC 1993: pentan-1,2,4-triol

B. SEGÚN LA POSICIÓN DEL HIDROXILO (-OH) EN LA CADENA CARBONADA:

Alcohol primario	Alcohol secundario	Alcohol terciario
$R - CH_2 - OH$	$ \begin{array}{c} R - CH - R' \\ \\ OH \end{array} $	$ \begin{array}{c} R' \\ \\ R - C - R'' \\ \\ OH \end{array} $
$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - OH \\ \quad \quad \quad \nearrow 1^\circ \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \\ OH \\ \quad \quad \quad \nearrow 2^\circ \end{array} $	$ \begin{array}{c} OH \\ \\ \text{CH}_3 - C - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \\ \quad \quad \quad \nearrow 3^\circ \end{array} $

Ejemplo:



Es un alcohol terciario

IUPAC 1979: 3-metil-5-hexin-3-ol

IUPAC 1993: 3-metilhex-5-in-3-ol

V. ÉTERES

son compuestos que en su estructura tienen como grupo funcional al oxi “ — O — ”.

Fórmula general:



Si los radicales:

- R- = R'- : éter simétrico
- R- = R'- / éter asimétrico.

A) Nomenclatura funcional o común

Sustituyente en orden alfabético (R-; R'-) **éter**

$\text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$ éter asimétrico
Etilmetiléter



$\text{C}_6\text{H}_5\text{-O-CH}_3$

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$ Dietiléter o éter etílico
(éter sulfúrico)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{-CH}_3$ etilisopropiléter

B) Nomenclatura sistemática o IUPAC:


Al radical con mayor # de C se nombra como un hidrocarburo y el radical de menor # de C pasa a ser un radical oxi “R-O-”.

Ejemplos de algunos radicales oxi “R-O-”:

$\text{CH}_3\text{-}\ddot{\text{O}}\text{-}$: metoxi

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-}\ddot{\text{O}}\text{-}$: etoxi

etoxi




1-etoxibutano


VI. ALDEHÍDOS

Son compuestos oxigenados que en su estructura tienen como grupo funcional al carbonilo “— **CHO**”.


Ejemplos: Los siguientes productos contienen aldehídos



- Se obtiene al oxidar a un alcohol primario:



- Su fórmula general es:



A) Nomenclatura funcional o común

Raíz común (# de C) **aldehído**

# de (C)	1	2	3	4	5
Raíz común	form	acet	propion	butir	valer

B) Nomenclatura sistemática o IUPAC:

El aldehído, se nombra cambiando la terminación “o” en el nombre del hidrocarburo correspondiente por la terminación “al”.



H-CHO : formaldehído (es parte del formol)
metanal

CH₃-CHO : acetaldehído
etanal


CH₃-CH₂-CHO : propionaldehído
propanal

CH₃-CH₂-CH₂-CHO : butiraldehído
butanal

CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CHO : valeraldehído
Pentanal








Si el aldehído es insaturado o tienen ramificaciones: la cadena principal se enumera iniciando por -CHO



Ejercicio 1

EX.AD. UNI 2019 - 1

¿Cuál de los siguientes compuestos representa a un aldehído?



Resolución 1

Nos piden reconocer el compuesto que representa a un aldehído.




Respuesta:

Clave: D


VII. CETONAS

Son compuestos oxigenados que en su estructura tienen como grupo funcional al carbonilo “ **– CO –** ”.

Ejemplos: Los siguientes productos contienen cetonas



- Se obtiene al oxidar a un alcohol secundario:



- Su fórmula general es:



- R- = R'- : cetona simétrica
- R- ≠ R'- : cetona asimétrica.

A) Nomenclatura funcional o común

Radicales en orden alfabético (R- ; R'-) **cetona**

Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$: cetona simétrica
dimetilcetona (acetona)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_3$ cetona asimétrica
etilmetilcetona

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ cetona asimétrica
etilisopropilcetona

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3\text{-C-CO-CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ cetona asimétrica
Ter-butilmetilcetona

B) Nomenclatura sistemática o IUPAC


Se cambia la terminación “o” en el nombre del hidrocarburo correspondiente por la terminación “ona”.

Si el # de C ≥ 5 , para nombrar a la cetona se enumera la cadena principal iniciando por el extremo más próximo al carbonilo “-CO-”


Ejemplos:

$\text{CH}_3\text{-CO-CH}_3$ Propanona (acetona)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_3$ Butanona



5-etil-3,7-dimetil-4-octanona
(5-etil-3,7-dimetiloctan-4-ona)



6-hepten-3-ona
(hept-6-en-7-ona)

Ejercicio 2

EX.AD. UNI 2020 - I

La acetona, $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$, se usa ampliamente como disolvente industrial. Al respecto, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

Número atómico: H=1; C=6; O=8

- I. La geometría alrededor del C del grupo carbonilo es plana trigonal.
- II. La acetona es un disolvente polar.
- III. Tiene una temperatura de ebullición mayor que la del 2-propanol.

A) VVV B) VVF C) VFF
D) FVV E) FFF

Resolución 2

Nos piden indicar V o F, respecto a la acetona

Analizamos la estructura de la acetona y las proposiciones dadas.


Respuesta: VVF

Clave: B


VIII. ÁCIDOS CARBOXILICOS

Son compuestos oxigenados que en su estructura tienen como grupo funcional al carboxilo “ **COOH** ”.


Ejemplos: Los siguientes productos contienen ácidos carboxílicos



- Se obtiene al oxidar un aldehído:



- Su fórmula general es:



A) Nomenclatura funcional o común

ácido Raíz común (# de C) **ico**

Ejemplos:

H-COOH ácido fórmico (presente en la ortiga y el veneno de la hormiga)

CH₃-COOH ácido acético (es parte del vinagre)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—COOH}$ ácido propiónico
(Preservante natural del queso Suizo)

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—COOH}$ ácido butírico
(Presente en la mantequilla)

B) Nomenclatura sistemática o IUPAC:

Ácido nombre del HC sin “o” **oico**


H—COOH ácido metanoico

$\text{CH}_3\text{—COOH}$ ácido etanoico


$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—COOH}$ ácido propanoico

$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—COOH}$ ácido butanoico

Si el ácido carboxílico es insaturado o tiene ramificaciones, la cadena principal se enumera iniciando por —COOH .



Ácido 4-etil-6,6-dimetilheptanoico



Ácido 4-etil-3-isopropil-7-metil-5-octenoico

IX. ÉSTERES

9.1. GRUPO FUNCIONAL : carboalcoxi ($-\text{COO}-$)

9.2. FÓRMULA GENERAL:



R; R':

Grupo alquilo o arilo

Ejemplo:

Los siguientes productos contienen ésteres

frambuesa




$\text{H}-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(aroma de frambuesa)




$\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(olor de piña)

9.3. OBTENCIÓN POR ESTERIFICACIÓN:



Ejemplo:



Las moléculas de los ésteres:

- son polares.
- se unen por fuerzas DD y FL.
- Si aumenta el # de C disminuye su polaridad.
- La esterificación **no es** una reacción de **neutralización**.
- La reacción inversa será una **hidrólisis**.

9.4. NOMENCLATURAS: dos sistemas

A. Nomenclatura funcional o común


Raíz común (R-COO) **ato de Raíz (R'-)**ilo****

Ejemplos:

$\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: formiato de etilo
(sabor a frambuesa, olor a ron)

$\text{CH}_3\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: acetato de etilo
(olor a piña)


$\text{CH}_3\text{-COO-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$: acetato de isopropilo
(olor a pera)

$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_2\text{-}$  : Butirato de bencilo
(olor a rosa, sabor a pera)

B. Nomenclatura sistemática o IUPAC:

nombre del hidrocarburo(R-COO)ato** de Raíz (R'-)**ilo**.**

Ejemplos: $\text{H-COO-CH}_2\text{-CH}_3$: metanoato de etilo
 $\text{CH}_3\text{-COO-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$: etanoato de isopropilo



- Los **ésteres** son isómeros de función de los **ácidos carboxílicos**

X. COMPUESTOS POLIFUNCIONALES


Son compuestos que presentan dos o más grupos funcionales en su estructura molecular.

En este caso será necesario definir el grupo funcional principal que determinará la cadena principal y el orden de numeración de los carbonos que forman la cadena; los demás grupos funcionales se consideran como sustituyentes.


Aumenta la prioridad

Grupo funcional	SUFIXO (como grupo principal)	PREFIJO (como sustituyente)
—COOH	Ácido ... ico	... carboxi
—COO —	... ato de ...	... carboalcoxi
—CHO	... al	... formil
—CO —	... ona	... oxo
—OH	... ol	... hidroxil
$\begin{array}{c} \text{—C} = \text{C—} \\ \quad \end{array}$	... eno	...
$\text{—C} \equiv \text{C—}$	... ino	...


Ejemplos: Nombrar los compuestos



IUPAC: 4-metilhex-5-en-2-ol



IUPAC: 1-hidroxi-3-metilheptan-4-ona



IUPAC: ácido 3-etil-4-formil-6-hidroxi-3,5-dimetilheptanoico

XI. BIBLIOGRAFÍA

- ❑ Chang, R. y Goldsby, K. (2017). **Química**. México. McGraw Hill Interamericana Editores
- ❑ Plana de Química. *Química: análisis de principios y aplicaciones*. Tomo II, 1.a edición. Lima: Lumbreras Editores
- ❑ Brown T. L., H. Eugene L., Bursten B.E., Murphy C.J., Woodward P.M. (2014). **Química, la ciencia central**. México. Pearson Educación.
- ❑ Morrison, R. y Boyd, R. Química orgánica. 5.a edición. Addison-Wesley, 1990
- ❑ Petrucci R. H., Herring F. G , Madura J. D y Bissonnette C. **Química General** (2011). Décima ed. España. PEARSON EDUCACIÓN, S. A.

SEMESTRAL
UNI




PRÁCTICA DIRIGIDA

academiacesarvallejo.edu.pe

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

1. Los compuestos orgánicos oxigenados, son ternario, contienen oxígeno divalente formando parte del respectivo grupo funcional. En la siguiente estructura molecular indique a los grupos funcionales presentes.




- A) carbonilo, hidróxido, éster
- B) hidroxilo, éter, carboxilo
- C) hidroxilo, aldehído, carbonilo
- D) carbonilo, hidroxilo, carboxilo
- E) éter, hidroxilo, carboxilo

RESOLUCIÓN 1

- Nos piden indicar a los grupos funcionales presentes en la estructura.

- Analizamos la estructura molecular dada



Respuesta: carbonilo, hidroxilo, carboxilo

Clave: D

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23


2. La siguiente fórmula molecular $C_4H_{10}O$ corresponde a varios monoles con isomería de cadena y de posición. Marque la alternativa que contenga, en el orden dado, el nombre IUPAC del alcohol terciario y del alcohol secundario.

- A) 2-metil-2-propanol y 2-metil-1-propanol
- B) 2-metil-1-propanol y 2-butanol
- C) 2-metil-2-propanol y 2-butanol
- D) 2-metil-2-propanol y 1-butanol
- E) 2-metil-1-propanol y 2-propanol

RESOLUCIÓN 2

- Nos piden reconocer el alcohol terciario y el alcohol secundario.


Formulamos los monoles isómeros de posición y de cadena:




1-butanol (alcohol primario)



2-butanol (alcohol secundario)



2-metil-1-propanol (alcohol primario)




2-metil-2-propanol (alcohol terciario)

Rpta: 2-metil-2-propanol y 2-butanol

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

3. Respecto a la siguiente estructura molecular:



Marque verdadero (V) o falso (F) luego de analizar las siguientes proposiciones:

- I. Se trata de un alcohol secundario con fórmula molecular $C_7H_{16}O$.
- II. Es un diol porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario.
- III. Su nomenclatura IUPAC es:
5-metil-4-hexanol.


- | | | |
|--------|--------|--------|
| A) VVF | B) VFV | C) VFF |
| D) FFF | | E) FVF |

RESOLUCIÓN 3

- Nos piden indicar V o F

Dato: Nos dan la fórmula topológica de un alcohol (monol).

Nombrando el monol:



III) FALSO

- ✓ Nombre: 2-metil-3-hexanol

I) VERDADERO

- ✓ Se trata de un alcohol secundario.
- ✓ Fórmula global: $C_7H_{16}O$

II) FALSO

- ✓ Es un monol cuyo $-OH$ está unido a un carbono secundario

Rpta: VFF

CLAVE: C

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

4. Los alcoholes y éteres son isómeros funcionales, pues presentan propiedades físicas y químicas diferentes. En base a lo anterior determine verdadero (V) o falso (F) cada proposición y marque la alternativa correspondiente.

I. El 1-butanol es isómero con el 1-metoxipropano, cuya fórmula es $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$.

II. A una misma temperatura, el dietiléter posee mayor presión de vapor que el 2-butanol.

III. El isómero 3-metil-2-metoxihexano posee 27 átomos.

A) VVV

B) FVV

C) FVF

D) FFF


E) FFV

RESOLUCIÓN 4


- Nos piden indicar V o F

Analizamos cada proposición:

I) **FALSO**



1-metoxipropano





II) **VERDADERO**

El dietiléter(a) y 2-butanol (b) son isómeros.

- En punto de ebullición: $a < b$
- En presión de vapor : $a > b$

III) **VERDADERO**




Rpta: FVV

CLAVE: B

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

5. Ciertos alcoholes son oxidados para dar aldehído y si se continua el proceso de oxidación, se pueden obtener ácidos carboxílicos. Considerando el siguiente aldehído:



Indique las proposiciones correctas.

- I. El alcohol utilizado es secundario de fórmula molecular $\text{C}_9\text{H}_{20}\text{O}$
- II. El nombre IUPAC es 2,4,5-trimetilhexanal
- III. El ácido producido es monocarboxílico


- A) II y III
- B) I, II y III
- C) I y II
- D) solo I
- E) solo II

RESOLUCIÓN 5


- Nos piden indicar las proposiciones correctas

I) INCORRECTO

- Se obtiene al oxidar a un alcohol primario:




II) CORRECTO



- Nombre: 2,4,5-trimetilhexanal

III) CORRECTO

- La oxidación de un aldehído forma ácido monocarboxílico:




Respuesta: II y III

Clave: A

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

6. El siguiente compuesto proviene de la oxidación del compuesto 4,6,7-trimetiloctan-2-ol



Indique la secuencia correcta, después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Es una cetona simétrica
- II. El nombre IUPAC es 4,6,7-trimetiloctan-2-ona
- III. Fácilmente se oxida generando el respectivo éster


- A) VVV B) FFF C) VVF
D) FVF E) FFV

RESOLUCIÓN 6

- Nos piden indicar V o F

Datos

- Nos dan la fórmula topológica de una cetona donde destaca el grupo funcional carbonilo.



Nombre IUPAC: 4,6,7-trimetiloctan -2- ona

Analizamos cada proposición:


- I) FALSO Es una cetona asimétrica.
- II) VERDADERO
- III) FALSO Una cetona no se oxida fácilmente.

Rpta: FVF

CLAVE: D

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

7. En base a la siguiente estructura molecular, cuya fórmula topológica se muestra, indique verdadero (V) o falso (F) al evaluar las siguientes proposiciones y marque la alternativa correcta.



- I. Se trata de un ácido monocarboxílico insaturado.
- II. Su nomenclatura IUPAC es ácido-4-isopropil-3,7-dimetiloctanoico.
- III. Su fórmula molecular es $C_{13}H_{26}O_2$.


- | | | |
|--------|--------|--------|
| A) FVV | B) FFV | C) VFV |
| D) VVV | | E) FVF |

RESOLUCIÓN 7

- Nos piden indicar V o F

Datos

- Nos dan la fórmula topológica del ácido carboxílico donde resalta el grupo funcional carboxilo.



Nombre: ácido-4-isopropil-3,7-dimetiloctanoico

Fórmula molecular: $C_{13}H_{26}O_2$

Analizamos cada proposición:


- I) FALSO Se trata de un ácido monocarboxílico saturado.
- II) VERDADERO
- III) VERDADERO

Rpta: FVV

CLAVE: A

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

8. Mediante la reacción reversible de alcohol y ácido carboxílico, en medio ácido, se obtiene éster con agua. Los esteres (no grasos) caracterizan el olor agradable de las frutas, rosas y flores. La siguiente fórmula corresponde a la sustancia con olor característico del plátano.



De las siguientes proposiciones, indique cuáles son correctas.

- I. Su nombre es etanoato de isopentilo.
- II. Para su obtención reacciono el ácido acético.
- III. Cuando se hidroliza se obtiene un alcohol cuya fórmula es $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$.


- A) solo I B) I y II C) solo II
D) II y III E) I, II y III

RESOLUCIÓN 8

- Nos piden indicar las proposiciones correctas

Datos

- Nos dan como dato la fórmula topológica de un éster y su característica de olor agradable.



Etanoato de isopentilo
Acetato de isopentilo

Analizamos cada proposición:

- I) CORRECTO
- II) CORRECTO Se obtiene de la reacción de ácido acético con isopentanol.
- III) INCORRECTO Al hidrolizar se obtiene el alcohol isopentanol: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Rpta: I y II

CLAVE: B

PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

9. Los compuestos polifuncionales llamado tambien compuestos heterofuncionales, contienen dos o mas grupos funcionales. Por ejemplo el siguiente compuesto molecular $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_2\text{--CHOH--CH=CH--COOH}$

Al respecto indique las proposiciones correctas.

- I. posee tres grupos funcionales
- II. el grupo funcional principal es el carboxilo
- III. El nombre IUPAC es ácido 4-hidroxi-6-oxoheptenoico

- A) solo I B) solo II C) solo III
- D) I y II E) I y III

RESOLUCIÓN 9

- Nos piden indicar las proposiciones correctas

Analizando cada alternativa:


I. INCORRECTO

Posee 4 grupos funcionales: -CO- , -OH , -COOH y enlace doble

II. CORRECTO

Orden principal: $\text{-COOH} > \text{-CO-} > \text{-OH} > \text{enlace doble}$

III. INCORRECTO



Nombre: ácido 4-hidroxi-6-oxo-2-heptenoico

Respuesta: solo II

Clave: 9



PRÁCTICA DIRIGIDA – SEMANA 23

10. Los isómeros son compuestos orgánicos con la misma fórmula molecular pero con propiedades diferentes. Indique la alternativa que no contiene a isómeros.

- A) 2-hexanol y hexan-1-ol
- B) metilpropilcetona y valeraldehido
- C) propanoato de etilo y ácido valérico
- D) 3-pentanona y 1-penten-2-ona
- E) 2-metilbutanal y valeraldehido

RESOLUCIÓN 10

- Nos piden indicar la alternativa que no contiene a isómeros.



Fórmula global: $C_6H_{14}O$

Son isómeros




Fórmula global: $C_5H_{10}O$

Son isómeros



Fórmula global: $C_5H_{10}O_2$

Son isómeros



Fórmula global: $C_5H_{10}O$

Fórmula global: C_5H_9O

No son isómeros



Fórmula global: $C_5H_{10}O$

Son isómeros

Clave: D

— ACADEMIA —

CÉSAR

VALLEJO

GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe